




โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายที่สุด



เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายลูกกระสุนปืน เชื้อนี้ถูกทำลายได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนแสงแดด น้ำยาฆ่าเชื้อพวกคลอรีน แอลกอฮอล์ กรดหรือด่างอย่างแรง เกิดได้ในสัตว์เลือดอุ่น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต หนู ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัข (96% ของจำนวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมาคือแมว



การติดต่อ

โดยการได้รับเชื้อที่อยู่ในสัตว์ จากการถูกกัด ข่วน เลื้อย หรือน้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล

ระยะฟักตัวในสุนัข

7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับเชื้อและความรุนแรง ของเชื้อโรค โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 6 สัปดาห์



อาการในสุนัข

มี 2 ชนิด คือ



1.ชนิดซึม สุนัขจะมีนิสัยแปลกไปจากเดิม ชอบถูกตามดมมึน กินอาหารและน้ำน้อยลง ถ้าถูกรบกวนจะดุร้าย กัด

ไปทั่ว ต่อมาจะเป็นอัมพาต และตายในที่สุด

2.ชนิดดุร้าย จะมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย หลุดหวัด ดุร้าย ขากวไกรแข็ง ปากอ้า ลิ้นห้อย น้ำลายไหล ม่านตาขยาย ร้องโดยไม่มีจุดหมาย ต่อมาจะมีอาการอัมพาต เริ่มจากกล้ามเนื้อคอ ทำให้กลืนน้ำลายหรือน้ำลำบาก (บางครั้งจึงเรียกโรคนี้ว่าโรคกั้วน้ำ) ระบบหายใจล้มเหลวและตายในที่สุด รวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแสดงอาการจนถึงตาย ประมาณไม่เกิน 10 วัน



ทำอย่างไรเมื่อถูกสุนัขกัด



1.ล้างแผล เมื่อสัตว์กัดหรือ

ข่วนจนเป็นแผล ต้องล้างแผลทันทีด้วยน้ำสบู่หลายๆ ครั้ง เพื่อให้เชื้อออกจากบาดแผลให้มากที่สุด

2.ใส่ยา ใส่ยาใส่แผล เช่น ทิงเจอร์เบตาดีน หรือแอลกอฮอล์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค และอย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกสโล ยาจน ลงในแผลเป็นอันตราย



3.กักหมา กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย 15 วัน เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้าย



กัดคนหรือสัตว์อื่น ถ้าไม่สามารถกักสัตว์นั้นไว้ได้ให้ทำลาย หรือถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

4.พาหมอ พบแพทย์หรือ

สัตวแพทย์ทันที เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรุ่ม อย่างไรก็ตามสัตว์ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตายให้รีบตัดหัวสัตว์ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทันที



<< กลับหน้าแรก

ล้างแผล ใส่ยา กักหมา พาหมอ

วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



1. ไม่ปล่อยสุนัขเห่าผ่าน สุนัขจรวัดที่อยู่ข้างถนนเป็นตัวแทนเชื้อโรคที่สำคัญ อาจกัดคนที่สัญจร หรือกัดสุนัข แมว หรือ




สัตว์อื่นๆ ทำให้สัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และแพร่เชื้อได้ต่อไป

2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่สัตว์ทุกปี เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ (ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535) ที่จะต้องนำสุนัขอายุตั้งแต่ 2 - 4 เดือน ไปรับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือฉีดซ้ำตามที่สัตวแพทย์กำหนด



3. อย่าให้สัตว์มีลูกมาก ควรควบคุมจำนวนสัตว์ด้วยการฉีดยาคุมกำเนิดให้สุนัข/สัตว์ตัวเมีย หรือผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อไม่ให้มีลูกมากเกินไปจนไม่สามารถดูแลได้ จนต้องนำไปปล่อยให้กลายเป็นสุนัขจรจัด



การส่งซากสัตว์ตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

1. เมื่อสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตายของให้นำถุงพลาสติกสวมหัวสัตว์นั้น แล้วจึงตัดหัวสัตว์บริเวณคอต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระเด็นขณะตัดหัวสัตว์ แล้วจึงนำถุงพลาสติกสวมทับอีกชั้นและขณะตัดหัวสัตว์ควรวางถุงมือก่อนทุกครั้ง

2. นำหัวสัตว์นั้นใส่กระติก แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา ขณะนำหัวส่งสัตว์ตรวจเพื่อทำการวินิจฉัย

3. ส่งหัวสัตว์พร้อมประวัติของสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ชื่อที่อยู่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์และผู้ถูกสัตว์นั้นกัด

สถานที่ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า

กรุงเทพมหานคร

- ศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2251-7025

- สถานเสาวภา

สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 0-2252-0161 - 4 ต่อ 26

- คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลศิริราช

โทร. 0-2411-3111, 0-2411-0263

ต่างจังหวัด

- สำนักงานปศุสัตว์เขต

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

โรคพิษสุนัขบ้า



เปิดหน้าถัดไป >>

ที่มา: กรมปศุสัตว์ กรมสุขภาพสัตว์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กรุงเทพฯ
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข