



การดูแลที่บ้าน เมื่อเป็นไข้เลือดออก

1. เช็ดตัวลดไข้



2. กินยาลดไข้พาราเซตามอลเท่านั้น



3. ดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่บ่อยๆ



4. งดเครื่องดื่มที่มีสีแดง ดำ หรือน้ำตาล



5. มีข้อสงสัยให้ปรึกษาหมอ



กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

สัญญาณ อันตราย

จาก ไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกที่อาการยังไม่รุนแรง
รักษาที่บ้านได้ แต่ให้สังเกตสัญญาณอันตราย



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

โทร. 032-310761, 032-310804

<http://dpc4.ddc.moph.go.th>

facebook กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สคร.สี่





สัญญาณอันตราย ต้องรีบไปโรงพยาบาล

1. มีไข้ตัวร้อนมา 2 วันกินยาแล้วไข้ไม่ลด



2. ไข้ลดแล้ว แต่ผู้ป่วยมีอาการซึม
ตัวเย็นผิวกาย



3. กินอะไรไม่ได้เลย หรือกินแล้วอาเจียน



4. กระสับกระส่าย ร้องกวนโยเย



อาการรุนแรงเสี่ยงต่อการตาย

1. อาเจียนเป็นสีดำ น้ำตาลคล้ำ สีแดง



2. ไม่รู้สึกตัว



3. ปัสสาวะน้อย

